


TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA EM ÉGUA CRIOLA: RELATO DE CASO



SANTOS, Leticia^{1*}; GOES, Alinne²; FLECK, Laura²
*leti.dsantoss@gmail.com

MULLER, Vitória³; BIANCHI, Eloisa³

¹ Residente do Programa de pós graduação em clínica e cirurgia - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.

² Discentes do Curso de Medicina Veterinária - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.

³ Docente do curso de Medicina Veterinária – Faculdade IDEAU – Bagé/RS.



HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO



MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Mostra de Criação e Inovação

INTRODUÇÃO

Os tumores ovarianos sucedem-se em todas as espécies domésticas, sendo comum em éguas. Em geral são tumores benignos, de crescimento unilateral e lento causando grandes alterações hormonais devido a secreção anormal de inibina e testosterona. Em éguas o tumor mais frequente é o das células da granulosa o qual causa alterações comportamentais na maioria dos casos.

OBJETIVO

O presente estudo buscou descrever o caso de uma égua crioula com tumor ovariano unilateral, a qual seria supostamente submetida ao procedimento de ovariectomia unilateral e, posteriormente identificação da neoplasia através de exame histopatológico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi atendida no Hospital Veterinário São Francisco da faculdade IDEAU campus Bagé, uma égua crioula de 6 anos, conforme Figura 1. A queixa principal do proprietário era que o animal não emprenhava, não manifestava estro (cio) a no mínimo 2 anos, tinha comportamento de garanhão bem como montava nas outras éguas que convivia.



Figura 1: Animal em avaliação clínica. FONTE: SANTOS, Leticia 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O animal passou por exame clínico completo, aonde realizou-se a palpação retal e observou-se aumento de volume em ovário esquerdo, não sendo possível a completa palpação do mesmo devido ao aumento de volume exacerbado. Útero e ovário direito não mostraram alterações, estando esses normais. Foi realizado também o exame ultrassonográfico (figura 2), aonde pôde-se notar aumento bem significativo no ovário esquerdo, não sendo possível medir e nem ter uma ideia precisa do tamanho devido ao tamanho da neoplasia.




Figura 2: Imagem ultrassonográfica de ovário esquerdo acometido pela neoplasia. FONTE: GOES, Alinne 2022.

O tratamento de eleição nesses casos de neoplasias ovarianas é a exérese cirúrgica, onde é realizada a ovariectomia unilateral e realizado também uma biópsia para posterior exame histopatológico para identificação da neoplasia acometida e ter um diagnóstico mais preciso.

CONCLUSÃO

Conclui-se que um conjunto de fatores para avaliação e diagnostico do paciente é indispensável, sendo esse um bom exame clínico, exame de imagem e avaliação geral do animal acometido bem como a exérese cirúrgica como ferramenta correta de tratamento.