

COMPLICAÇÕES DE FOOT ROT EM OVINOS



FARIAS, Raiana Silva¹; PEREIRA, Anaí Aveiro¹; ROBAINA, Raquel Gonçalves¹; JARDIM, Dienifer Jardim¹

anaierubens2@gmail.com

ROSA, Loreane da Rosa²; LEMOS, Felipe Machado²; SIMÕES, Michele Scholant²; BIANCHI, Eloisa²

¹ Discentes do Curso de Medicina Veterinária, Nível V 2025/1 - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.

² Docentes do Curso de Medicina Veterinária, Nível V 2025/1 - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.



INTRODUÇÃO

A pododermatite infecciosa é conhecida também como pododermatite contagiosa, pietin, Foot-Rot, podridão dos cascos, manqueira ou peeira, enfermidade que pode causar grandes prejuízos aos rebanhos de ovinos, principalmente nos períodos de alta umidade e calor, quando há uma maior incidência.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi descrever um caso de Foot Rot em um ovino e suas complicações.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi feito um acompanhamento clínico de um ovino da raça ideal 4 dentes, identificação de tatuagem 286 com foot hot no Hospital Veterinário São Francisco da faculdade IDEAU em Bagé/RS.


Na avaliação clínica apresentou parâmetros normais e nos exames específicos do sistema locomotor foi encontrado uma miíase e presença de abscesso interdigital no casco (figura 1). Para melhor diagnóstico foi realizada cultura e antibiograma catálise negativa, não hemolítica. Sendo assim iniciou-se tratamento com antibióticos à base de penicilina (20.000 UI/kg) por 5 dias e 3 dias de anti inflamatório a base de dexametasona (10mg), limpeza local com iodo tópico e gaze, a ferida era mantida fechada (figura 2).

O animal foi avaliado novamente porque estava mancando e com o casco muito inchado, foi drenado o local da ferida e feita uma nova medicação com antibiótico Enrofloxacino 2,5mg/kg por 5 dias e 3 dias de dexametasona (10mg) e mais 10 dias de pedilúvio com permanganato de potássio (figura 3).

Figura 1: miíase



Figura 2: limpeza e curativo.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o tratamento da "Foot hot" com antibióticos, limpeza e higienização dos cascos e monitoramento por 30 dias, a ferida foi cicatrizando lentamente e cessou a claudicação (figura 4), a realização de cultura e antibiograma foi decisiva para a escolha eficaz do antibiótico utilizado e a total recuperação do ovino (figura 5).

Figura 3: pedilúvio.



Figura 4: cicatrizado.



Figura 5: totalmente recuperado.



CONCLUSÃO

A Foot-Rot é uma doença grave que pode causar sérios problemas de locomoção e perdas econômicas para os produtores. É essencial implementar medidas de manejo e controle adequadas, incluindo cuidados com os cascos, para prevenir e tratar essa enfermidade, garantindo o bem-estar do rebanho ovino.