LIPOMA CANINO - RELATO DE CASO

MEDINA, Bruno; STRICKLER, Davi; COSTA, Natália; VAZ, Nicolle*
*nicollecardosov@gmail.com

LEMOS, Felipe Machado[2]; ROSA, Loreane da Rosa[2], SCHOLANT, Michele da Rosa[2]; BIANCHI, Eloisa[2]

[1]Discentes do Curso de Medicina Veterinária, Nível VII 2025/1 - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.
[2] Docentes do Curso de Medicina Veterinária, Nível VII 2025/1 - Faculdade IDEAU – Bagé/RS.

INTRODUÇÃO

O lipoma é uma neoplasia mesenquimal benigna de adipócitos, tem uma frequência maior nas formas subcutânea ou dérmica. O presente trabalho teve como objetivo descrever um caso clínico cirúrgico de exérese de lipoma de um canino em uma ONG sem fins lucrativos no município de Bagé - RS.

MATERIAL E MÉTODOS

Dados do animal: Canino fêmea, SRD, 6,8 kg, doze anos.

Exame físico: Temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória dentro dos parâmetros fisiológicos.

Punção aspirativa por agulha fina: Trouxe a confirmação de lipoma.

Protocolo anestésico dissociativo: Pré-anestésico xilazina 0,15 ml/kg e sedativo quetamina 0,1 ml/kg, ambas intramusculares. Para manutenção anestésica, fez-se a associação de soro fisiológico com solução MLK (1 ml de Morfina, 7,5 ml de Lidocaína e 0,3 ml de Quetamina em 500 ml de solução fisiológica).

1. Lipoma na região pré-esternal

2. Incisão na pele

3. Divulsão dos tecidos

4. Remoção do lipoma

5. Sutura de aproximação

6. Sutura em U deitado (wolff)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A remoção do lipoma ocorreu sem intercorrências, com boa recuperação anestésica e retorno da consciência 30 minutos após o término da cirurgia. O tutor foi orientado quanto aos cuidados domiciliares e retorno para retirada de pontos em 15 dias. Para medicação em casa, receitou-se 1 comprimido de cefalexina (150 mg), BID durante 10 dias e 1 comprimido de Meloxicam (1 mg), SID, durante 3 dias. Entretanto, retornou apenas 25 dias depois com os pontos aderidos e infeccionados.

Apesar de ser considerada uma neoplasia com caráter benigno, que não apresenta risco imediato à vida do animal, é necessário considerar fatores como a localização anatômica e a característica de crescimento do lipoma e se há presença de desconforto ou dor no paciente.

CONCLUSÃO

A anamnese e exame físico, em consonância com achados citológicos são de extrema importância para identificação da neoplasia e para o médico veterinário escolher a melhor conduta. O prognóstico é considerado favorável na maioria dos casos, pois o tumor geralmente é bem circunscrito e sem a presença de destruição dos tecidos adjacentes.